



安邦集团

除草剂系列之

苄嘧磺隆·乙草胺

Bensulfuron Methyl



产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
苄嘧磺隆·乙草胺	4.5%苄嘧磺隆·15.5%乙草胺	可湿性粉剂	PD20095529

产品特性

Product Characteristics

本品由苄嘧磺隆和乙草胺复配而成的除草剂，具有内吸、传导性。可用于水稻移栽田部分多年生阔叶杂草、一年生杂草的防除。杂草主要通过根部吸收，药剂进入杂草体内能迅速向各分生组织传导，在植株顶端抑制细胞分裂及细胞长大，使生长点停止生长，幼嫩叶片不能伸展，光合作用受到抑制，从而导致杂草死亡。

关键技术信息 Technology Information

- 选择性强-对稗草等禾本科杂草，以及牛毛草、水莎草、鸭舌草、泽泻、水苋菜、野慈菇等大部分莎草科及阔叶类杂草有特效。
- 持效期长-次施药可解除水稻全季草害。
- 安全性高-对当茬和后茬作物安全，对人、畜毒性低。

针对作物 The Crops



使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻移栽大田	稗草、牛毛草、水莎草、 萤蔺、鸭舌草、泽泻、水 苋菜、野慈菇	25 - 35克/亩	药土法或药肥法。每亩先备好约20公斤湿润细土，达到手握成团，松之能散的程度。每亩用量与少量湿润细土拌匀成母土，再加足20公斤湿润细土拌匀后撒施，或将母土与肥料拌成药肥撒施。

使用说明 Instructions for use

- 用药量：通常每亩用本品25—35克。
 - 施药期：水稻移栽后5-7天内，在杂草出土前或杂草出土后1-2叶期使用，效果尤为显著。
 - 施药方法：药土法或药肥法。每亩先备好约20公斤湿润细土，达到手握成团，松之能散的程度。每亩用量与少量湿润细土拌匀成母土，再加足20公斤湿润细土拌匀后撒施，或将母土与肥料拌成药肥撒施。
- 注意事项：1、本品仅限在长江流域及其以南地区大苗（30天以上秧龄）水稻移栽田使用，不能用于秧田、直播田、小苗移栽田、病弱苗田、制种田、漏水田等。2、施药期：水稻移栽后5-7天，水稻完全缓苗后，稗草1叶1心期前药土法均匀撒施。3、撒药前后田间应保持3-5厘米的浅水层，药后继续保水5-7天。4、撒药前后的水层均不得淹没秧苗心叶，否则易产生药害。5、严禁用喷雾和泼浇法施药。

关键卖点 The key selling point

- 选择性强-对稗草等禾本科杂草。防治对象明确。

