



安邦集团

除草剂系列之

醚磺隆
Cinosulfuron



福田除草
耕夫最好

产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
醚磺隆	10%	可湿性粉剂	PD20091726

产品特性

Product Characteristics

本品属磺酰脲类除草剂。主要通过根部和茎部吸收，由输导组织传送到分生组织，抑制支链氨基酸（如缬氨酸、异亮氨酸）的生物合成。用药后杂草停止生长，5 - 10天后植株开始黄化，枯萎死亡。本品可用于防治水稻移栽田一年生阔叶杂草及莎草科杂草。

品牌定位 Brand positioning

- 全国唯一登记产品，对水稻田除草安全高效广谱，必将成为农民信赖的产品。

关键技术信息 Technology Information

- 毒性低-大白鼠急性经口LD₅₀ > 5000mg/kg，对鸟类、鱼类及水生生物低毒，对蜜蜂无害，对环境无污染，收获时稻米中无残留物检出。
- 杀草谱广-对稻田多种顽固性阔叶杂草及莎草有特效。
- 施药时间灵活-播后或插秧后3-15天均可使用，兼有芽前、芽后作用。
- 持效期长-施药一次，足够一个生长季节控草。
- 安全性高-对水稻及下茬作物极为安全。

针对作物 The Crops

关键卖点 The key selling point

- 全国唯一登记。
- 杀草谱广。
- 安全持效。



使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻	异型莎草、牛毛毡、碎米莎草、萤蔺、水苋菜、陌上菜、小茨藻、鲤肠、丁香蓼、眼子菜、鸭舌草	10-20克/亩	兑水40-50公斤搅匀作常规喷雾或与细土、肥料等混匀撒施

使用说明 Instructions for use

- 用量及使用方法：每亩用10%可湿性粉10-20克，兑水40-50公斤搅匀作常规喷雾或与细土、肥料等混匀撒施。
- 施药适期：秧田、直播田在秧苗2叶1心期后即可施药，移栽大田、抛秧田在移栽后5-10天施药。
(1)公顷用制剂量=亩用制剂量×15
(2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数
- 1.在水稻移栽后4-10天内用药为最佳。2.施药前后田间应保持2-4厘米的浅水层，药后保水5-7天。3.重砂性土漏水田慎用，以免发生药害。

