



安邦集团

杀虫剂系列之

硫丹

Endosulfan



谁能保棉杀虫
安邦硫单称雄

产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
硫丹	35%	乳油	PD20082816

产品特性

Product Characteristics

硫丹具有触杀、胃毒作用，气温高于20℃时有一定的熏蒸作用，用于防治棉花棉铃虫。

关键技术信息 Technology Information

- 施药时期：棉铃虫处于低龄幼虫期，未钻蛀前。
- 喷雾均匀周到。
- 大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

针对作物 The Crops



关键卖点 The key selling point

- 杀虫谱广：对棉花、茶叶、果树、烟草、大豆、蔬菜等多种作物上的多种害虫及部分螨类(跗线螨、瘿螨)有效。
- 作用方式多样：不仅具有胃毒和触杀作用，且在高温下，也有一定的熏蒸作用。
- 选择性强，易降解，对天敌和许多有益生物无害。
- 昆虫对本品不易产生抗性。
- 与菊脂类、有机磷类及氨基酸脂类杀虫剂混用有明显的增效作用。
- 可提高作物品质，施用后作物叶色更绿，植株更健壮。

使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
棉花	棉铃虫	120—180克/亩	喷雾

使用说明 Instructions for use

- 本品在棉花上的安全间隔期为14天。每个作物周期的最多使用次数为3次。
- 操作本品时不饮食、不抽烟。不迎风喷药，避免吸入药雾。不要让无关人员及动物进入刚施药区。
- 使用本品时应戴防护手套，防毒面具，穿干净防护服。使用完毕后应用肥皂和清水清洗裸露的皮肤和衣服，避免与皮肤、眼睛直接接触，防止由口、鼻吸入。
- 本品易燃，应远离火源和热源。
- 本品对鱼高毒，切不可将废液、清洗液倒入河塘等水源。
- 施药后应及时清洗药械，用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。
- 本品对家畜有害。
- 严禁用在烟草、蔬菜、果树、中草药上。
- 避免长期连续使用硫丹。建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用。

